

# Qué opinan los profesionales

Descargue  
**AQUÍ**  
la infografía  
en PDF

sobre la importancia de la suplementación  
nutricional oral (SNO) en pacientes  
con problemas de tolerancia o malabsorción

**PERFIL DE LA MUESTRA:** profesionales implicados en el tratamiento nutricional de pacientes con riesgo de desnutrición o desnutridos

**ANÁLISIS SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON:** tipo de paciente, duración y dosis del tratamiento prescrito, adherencia y tolerancia del suplemento nutricional Peptamen® 1.6

Más de **200**  
profesionales  
de distintas  
especialidades

**33 preguntas**  
divididas en  
5 bloques

Encuesta  
digital basada  
en el **método**  
**Delphi**

Consenso  
aceptado  
**a partir**  
**del 80 %**

**80 %**

## Comité científico

**Dr. Rafael López Urdiales**

Servicio de Endocrinología y Nutrición.  
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona

**Dr. Darío Sánchez Cabrero**


Servicio de Oncología Médica.  
Hospital Universitario La Paz. Madrid

La **intolerancia gastrointestinal**  
puede repercutir negativamente  
en los resultados clínicos  
del paciente<sup>1</sup>

Empeorar la  
**desnutrición**


Incumplimiento de la  
**pauta prescrita**

## Perfil del profesional



## Promedio de pacientes candidatos a utilizar Peptamen® 1.6 según patología


### Paciente no oncológico



n= 213 encuestados

- Sospecha/riesgo de trastornos gastrointestinales
- Otros trastornos de malabsorción
- Desnutrición grave
- Paso de nutrición parenteral a enteral
- Enfermedad inflamatoria (Crohn, colitis ulcerosa...)
- Cirugía hepatobiliar y pancreática
- Cirugía bariátrica/metabólica
- Alto grado de estrés metabólico


### Paciente oncológico gastrointestinal



n= 213 encuestados

- En tratamiento activo combinado (QT/RT)
- En tratamiento activo con inmunoterapia
- Sometido a cirugía
- En tratamiento activo con quimioterapia
- En tratamiento activo con radioterapia

### Paciente oncológico no gastrointestinal



n= 213 encuestados

- En tratamiento activo combinado (QT/RT)
- En tratamiento activo con inmunoterapia
- Sometido a cirugía
- En tratamiento activo con quimioterapia
- En tratamiento activo con radioterapia
- Otras

Es en los pacientes que presentan **desnutrición grave, sospecha de trastornos gastrointestinales y enfermedad inflamatoria intestinal** en quienes más se ha indicado el uso de Peptamen® 1.6

De entre los pacientes oncológicos gastrointestinales, aquellos que están **sometidos a cirugía** son los que más han recibido indicación para usar Peptamen® 1.6

De entre los pacientes oncológicos no gastrointestinales, aquellos que están **en tratamiento activo combinado (QT/RT)** son los que más han recibido indicación para usar Peptamen® 1.6

Según el **78,40%** de los profesionales, la probabilidad de uso de una fórmula peptídica como Peptamen® 1.6 tiende a aumentar con la edad

### ¿Cuál es la caracterización del tratamiento prescrito?

Por lo general, la dosis más empleada es **300-400 mL/día**

Se tiende a que la duración media del tratamiento sea de **3-6 meses** en la mayoría de los perfiles de pacientes

### ¿Qué atributos consideran más importantes para la elección de Peptamen® 1.6?

Buen sabor y textura



Aporte calórico y proteico



Buena tolerancia gastrointestinal



Facilidad de digestión




En caso de que se prescriba Peptamen® 1.6 a un paciente que estaba tomando otro suplemento, ¿cuál o cuáles son los motivos del cambio?

El motivo de **cambio a Peptamen® 1.6 durante el tratamiento nutricional** suele deberse a **problemas de tolerancia y de absorción** experimentados con otros suplementos previos.


## Tolerancia y adherencia de Peptamen® 1.6

### Tolerancia



Más del **75%** de los profesionales tiene un **grado de satisfacción entre 8 y 10** con el uso de Peptamen® 1.6

### Adherencia



El **81,7%** de los profesionales afirma que la dosis que toman los pacientes **se ajusta a la prescrita**, indicando una buena adherencia al tratamiento

En general, se resalta una opinión **muy favorable de los profesionales** respecto a la **tolerancia y adherencia** de Peptamen® 1.6, característica considerada destacable en la **elección del tratamiento**

### Satisfacción del profesional con la fórmula Peptamen® 1.6

El **98,1%** afirma que la mayoría de los pacientes que han utilizado Peptamen® 1.6 experimentaron **mejoras en su estado nutricional**

El **91,5%** afirma que la mayoría de los pacientes que han utilizado Peptamen® 1.6 han tenido resultados positivos en términos de su **estado físico y emocional**

**Peptamen® 1.6** da respuesta a los pacientes con problemas de tolerancia gastrointestinal o malabsorción



Fórmula completa hiperproteica e hipercalórica, con un **100 % de lactoproteínas séricas hidrolizadas** y un **70 % de MCT** para pacientes con problemas de tolerancia o alteraciones gastrointestinales

CI: 505249

\*Según el Real Decreto 1205/2010, en las indicaciones que marca el RD 1030/2006.

MCT: triglicéridos de cadena media.

1. McClave SA, et al. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2009; 33(3): 277-316.